

Тесты по дисциплине «Питание здорового и больного ребёнка» для студентов 6 курса
специальности «Педиатрия»

Правильный ответ выделен полужирным шрифтом.

6 курс

1. **СТУЛ У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 1 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- А) оформленным
- Б) кашицеобразным
- В) фрагментированным
- Г) веретенообразным

2. **СТУЛ У РЕБЕНКА НА ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ДО ВВЕДЕНИЯ ПРИКОРМА**

- А) золотисто-желтого цвета
- Б) содержит мало воды
- В) 1-2 раза в сутки
- Г) имеет щелочную реакцию

3. **ПОТРЕБНОСТЬ РЕБЕНКА 4-6 МЕСЯЦЕВ В БЕЛКАХ СОСТАВЛЯЕТ Г НА 1 КГ МАССЫ ТЕЛА**

- А) 2,6
- Б) 2,0
- В) 2,9
- Г) 3,2

4. **КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ УГЛЕВОДОВ ЖЕНСКОГО МОЛОКА ПРЕДСТАВЛЕН**

- А) **β-лактозой**
- Б) α-лактозой
- В) глюкозой
- Г) мальтодекстрином

5. **ПОТРЕБНОСТЬ В КАЛОРИЯХ РЕБЁНКА 0-3 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ
ККАЛ/КГ/СУТКИ**

- А) 115
- Б) 120
- В) 110
- Г) 100

6. **СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В ГРУДНОМ МОЛОКЕ СОСТАВЛЯЕТ _____**

Г/100 МЛ

- А) 1,0
- Б) 2,0
- В) 1,5
- Г) 2,2

7. **ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЛКАХ (Г/КГ/СУТКИ) ДЛЯ РЕБЁНКА 7-12 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ**

- А) 2,9
- Б) 2,2
- В) 3,5
- Г) 2,6

8. **ПОТРЕБНОСТЬ В КАЛОРИЯХ РЕБЁНКА 10-12 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ
ККАЛ/КГ/СУТКИ**

- А) 110
- Б) 120
- В) 115
- Г) 100

9.ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ СО СТОРОНЫ РЕБЁНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А)фенилкетонурия
- Б) недоношенность
- В)гемолитическая болезнь новорожденного
- Г) оперативное родоразрешение

10. ЖЕНСКОЕ МОЛОКО ПО СРАВНЕНИЮ С КОРОВЬИМ МОЛОКОМ ИМЕЕТ БОЛЕЕ

- А)высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот
- Б) низкое содержание железа
- В)высокий уровень белка
- Г) низкое содержание углеводов

11. КОРМЛЕНИЕ МОЛОКОМ МАТЕРИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИ

- А)приеме матерью цитостатиков
- Б) приеме матерью антибиотиков
- В)ВИЧ у матери
- Г) сахарном диабете у матери

12.1-Я СТЕПЕНЬ ГИПОГАЛАКТИИ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕФИЦИТУ МОЛОКА ДО (%)

- А) 25
- Б) 10
- В)20
- Г) 30

13. ДЕФИЦИТ МОЛОКА (%) ПРИ 2-Й СТЕПЕНИ ГИПОГАЛАКТИИ СОСТАВЛЯЕТ ДО

- А)50
- Б) 40
- В)30
- Г) 20

14. ПРИ ГРУДНОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ПРЕОБЛАДАЮЩЕЙ ФЛОРОЙ КИШЕЧНИКА ЯВЛЯЮТСЯ

- А)бифидум-бактерии
- Б) ацидофильные палочки
- В)кишечные палочки
- Г) энтерококки

15. В КАЧЕСТВЕ ПЕРВОГО ПРИКОРМА СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ

- А) овощное пюре
- Б) фруктовый сок
- В) манную кашу
- Г) овсяную кашу

16.СООТНОШЕНИЕ БЕЛКОВ И ЖИРОВ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1:1
- Б) 1:2
- В) 1:3
- Г) 1:4

17.В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ ИНГРЕДИЕНТАМИ ПИЩИ-Б : Ж : У

- А) 1 : 1 : 4
- Б) 1 : 1 : 3
- В) 1 : 2 : 4
- Г) 1 : 2 : 5

18. ИДЕАЛЬНОЙ ПИЩЕЙ ДЛЯ ГРУДНОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) молоко матери
- Б) адаптированная молочная смесь
- В) пастеризованное козье молоко
- Г) пастеризованное коровье молоко

19. СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ» ПРИКОРМЫ СЛЕДУЕТ ВВОДИТЬ С МЕСЯЦЕВ

- А) 4-6
- Б) 6-8
- В) 5-8
- Г) 8-10

20. К МЕРОПРИЯТИЯМ ПЕРВИЧНОЙ ПОСТНАТАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСИТСЯ

- А) естественное вскармливание
- Б) соблюдение беременной женщиной рациональной диеты
- В) введение прикорма с 3 месяцев
- Г) введение прикорма после 6 месяцев

21. ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ НИИ ПИТАНИЯ РАМН ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ % ИХ СУТОЧНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ

- А) 30-50
- Б) 10-20
- В) 60-70
- Г) 15-25

22. МАКСИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ САХАРОВ В РАЦИОНЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ НИИ ПИТАНИЯ РАМН СОСТАВЛЯЕТ % СУТОЧНОГО ПОСТУПЛЕНИЯ УГЛЕВОДОВ

- А) 20
- Б) 10
- В) 30
- Г) 15

23. КАКОВЫ СРОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА?

- А) внутриутробно
- Б) постнатально после первого кормления ребенка
- В) в раннем возрасте
- Г) в период новорожденности

24. В СЛЮНЕ СОДЕРЖИТСЯ ФЕРМЕНТ

- А) амилаза
- Б) лактаза
- В) протеаза
- Г) мальтаза

25. ФЕРМЕНТОМ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ВЫСТУПАЕТ

- А) пепсиноген I
- Б) амилаза
- В) трипсинаген
- Г) лактаза

26. КАКОВА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОЙ СЕКРЕЦИИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ?

- А) низкая кислотность (рН выше 4)
- Б) высокая кислотность (рН ниже 2)
- В) кислотность обусловлена соляной кислотой
- Г) высокая протеолитическая активность

27. НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫМ КОМПОНЕНТОМ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ ЖИЗНИ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) гастрин (пепсиноген II)
- Б) пепсин (пепсиноген I)
- В) соляная кислота
- Г) трипсиноген

28. В ЖЕЛУДКЕ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ РАСЩЕПЛЯЮТСЯ

- А) белки до полипептидов
- Б) белки до три- и дипептидов
- В) жиры до ди- и моноглицеридов
- Г) углеводы до дисахаридов

29. КАКОЙ ПРОЦЕСС ПРОИСХОДИТ В ЖЕЛУДКЕ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ?

- А) денатурация белков (створаживание молока)
- Б) заметного протеолиза нет
- В) расщепление белков до полипептидов
- Г) расщепление углеводов до моносахаридов

30. КАКОВА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ?

- А) к рождению более незрелая экзокринная функция
- Б) к рождению более незрелая эндокринная функция
- В) к рождению зрелая экзокринная функция
- Г) становление ферментативной активности не зависит от вида вскармливания

31. ЖИРЫ РАСЩЕПЛЯЕТ ФЕРМЕНТ ПОДЖЕЛУДОЧНОГО СОКА

- А) липаза
- Б) эластаза
- В) лактаза
- Г) сахараза

32. КАКОВА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПЕЧЕНИ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА?

- А) незрелость к рождению
- Б) зрелость к рождению
- В) сроки созревания различных функций печени равномерны
- Г) обезвреживающая функция выражена хорошо

33. БАКТЕРИЦИДНЫЙ ЭФФЕКТ ЖЕЛЧИ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ СВЯЗАН, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, С ПРЕОБЛАДАНИЕМ В СОСТАВЕ

- А) таурохолевой кислоты
- Б) гликохолевой кислоты
- В) холестерина
- Г) билирубина

34. КАКОВА ФУНКЦИЯ ТОНКОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ?

- А) пищеварение и всасывание конечных продуктов гидролиза
- Б) формирование мицелл в просвете тонкой кишки
- В) кислотообразующая
- Г) желчеобразования

35. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ КИСЛОГО СОДЕРЖИМОГО ЖЕЛУДКА ПРОИСХОДИТ В ОТДЕЛАХ ЖКТ

- А) проксимальных тонкой кишки
- Б) пилорическом желудка
- В) дистальных тонкой кишки
- Г) восходящем ободочной кишки

36. КИШЕЧНЫМИ ЖЕЛЕЗАМИ ВЫДЕЛЯЕТСЯ ФЕРМЕНТ

- А) липаза
- Б) трипсин
- В) пепсин
- Г) коллагеназа

37. КАКОВА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ТОНКОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА?

- А) относительно высокая проницаемость слизистой оболочки
- Б) активность всасывания невысокая
- В) относительно низкая проницаемость слизистой оболочки
- Г) барьерно-защитная функция повышена

38. ЧАСТОТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ СО СТОРОНЫ ЖКТ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОБЪЯСНЯЕТСЯ

- А) недостаточностью секреторного аппарата
- Б) тонкостью слизистой оболочки и большой ее проницаемостью
- В) недостаточным кровоснабжением слизистой
- Г) большой проницаемостью слизистой оболочки

39. КАКОВА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ТОНКОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА?

- А) преобладание полостного пищеварения
- Б) преобладание мембранного пищеварения
- В) высокая активность собственно кишечных ферментов
- Г) достаточная активность ферментов щеточной каемки энтероцитов

40. НЕДОСТАТОЧНОСТЬ ПОЛОСТНОГО ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ КОМПЕНСИРУЕТ

- А) аутолиз
- Б) ускоренное продвижение химуса в краниокаудальном направлении
- В) проксимальный сдвиг пищеварения
- Г) высокая барьерно-защитная функция

41. В РАСЩЕПЛЕНИИ БЕЛКОВ И ПЕПТИДОВ В ТОНКОЙ КИШКЕ УЧАСТВУЮТ ФЕРМЕНТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

- А) трипсин
- Б) амилаза
- В) пепсин
- Г) коллагеназа

42. КАКИЕ СОБСТВЕННО КИШЕЧНЫЕ ФЕРМЕНТЫ УЧАСТВУЮТ В РАСЩЕПЛЕНИИ ПЕПТИДОВ В ТОНКОЙ КИШКЕ?

- А) трипептидазы
- Б) химотрипсин
- В) карбоксипептидаза
- Г) амилаза

43. КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРОТЕОЛИЗА В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) свободные аминокислоты
- Б) олигопептиды

- В) ди- и трипептиды
- Г) полипептиды

44. В РАСЩЕПЛЕНИИ ПОЛИСАХАРИДОВ УЧАСТВУЕТ

- А) амилаза
- Б) эластаза
- В) лактаза
- Г) мальтаза

45. АМИЛАЗА СЛЮНЫ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ГРУДНОГО МОЛОКА РАСЩЕПЛЯЕТ ПОЛИСАХАРИДЫ ДО

- А) мальтозы
- Б) глюкозы
- В) фруктозы
- Г) сахарозы

46. КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ РАСЩЕПЛЕНИЯ УГЛЕВОДОВ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАНИЕ

- А) моносахаридов
- Б) дисахаридов
- В) олигосахаридов
- Г) трисахаридов

47. С КАКИМ ФАКТОРОМ СВЯЗАНА НИЗКАЯ АМИЛОЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО СОКА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ?

- А) отсутствие полисахаридов в питании
- Б) молочное питание
- В) низкий уровень секретина
- Г) преобладание полостного пищеварения

48. НАРАСТАНИЕ АМИЛАЗНОЙ АКТИВНОСТИ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО СОКА И СЛЮНЫ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ ПРОИСХОДИТ

- А) после введения прикорма
- Б) с 1 -го месяца жизни
- В) к концу 1 -го года жизни
- Г) с 3-го месяца жизни

49. ОСНОВНЫМ УГЛЕВОДОМ В ПИТАНИИ РЕБЕНКА 1-ГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) лактоза
- Б) сахароза
- В) крахмал
- Г) гликоген

50. НАИМЕНЬШУЮ АКТИВНОСТЬ К РОЖДЕНИЮ РЕБЕНКА ИМЕЕТ ФЕРМЕНТ

- А) лактаза
- Б) мальтаза
- В) сахараза
- Г) изомальтаза

51. ТВОРОГ СЛЕДУЕТ ВВОДИТЬ ДЕТАМ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ С ВОЗРАСТА МЕСЯЦЕВ

- А) 6
- Б) 4
- В) 5
- Г) 8

52. СРЕДНЕЕ ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ ЗА СУТКИ РЕБЕНКА ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ РАЗ(А)

- А) 5
- Б) 3
- В) 4
- Г) 6

53. РАЗОВЫЙ ОБЪЕМ ПИТАНИЯ РЕБЕНКА 2-ГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ РАВЕН МИЛЛИЛИТРОВ

- А) 200
- Б) 100
- В) 120
- Г) 150

54. ОБЪЕМ ПИТАНИЯ РЕБЕНКА 6-12 МЕСЯЦЕВ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ МЛ/СУТКИ

- А) 1000
- Б) 800
- В) 1200
- Г) 1400

55. ПОТРЕБНОСТЬ В УГЛЕВОДАХ (В ГРАММАХ НА 1 КГ МАССЫ ТЕЛА) ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 12-14
- Б) 5-8
- В) 8-10
- Г) 10-12

56. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ СО СТОРОНЫ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) галактоземия
- Б) фенилкетонурия
- В) целиакия
- Г) первичная лактазная недостаточность

57. ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МОЛОКА У МАТЕРИ СЛЕДУЕТ

- А) увеличить частоту прикладывания ребёнка к груди
- Б) уменьшить частоту прикладывания ребёнка к груди
- В) уменьшить физические нагрузки матери
- Г) увеличить физические нагрузки матери

58. ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ I СТЕПЕНИ МАТЕРИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- А) увеличить число кормлений грудью
- Б) назначить докорм
- В) ввести прикорм
- Г) отказаться от ночных кормлений

59. ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЛКАХ ДЛЯ РЕБЁНКА 0-3 МЕСЯЦЕВ (Г/КГ/СУТКИ) ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2,2
- Б) 2,0
- В) 2,9
- Г) 2,6

60. СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В ГРУДНОМ МОЛОКЕ СОСТАВЛЯЕТ Г/100 МЛ

- А) 1,2
- Б) 2,0
- В) 2,8

Г) 3,5

61. ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ РЕБЕНКА С АЛЛЕРГИЕЙ НА БЕЛОК КОРОВЬЕГО МОЛОКА СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ

- А) смеси на основе полного гидролизата белка
- Б) адаптированные молочные смеси
- В) безлактозные смеси
- Г) кисломолочные смеси

62. ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ РЕБЁНКА В ВОЗРАСТЕ 1 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 5 раз в сутки
- Б) по требованию
- В) 6 раз в сутки
- Г) 3 раза в сутки

63. ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ РЕБЁНКА 2 МЕСЯЦЕВ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 6 раз в сутки
- Б) по требованию
- В) 4 раза в сутки
- Г) 7 раз в сутки

64. СООТНОШЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В ЖЕНСКОМ МОЛОКЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2 : 1
- Б) 1 : 2
- В) 1 : 1
- Г) 3 : 2

65. ПЕРВЫМ ПРИКОРМОМ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ РЕБЕНКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВОДИТЬ

- А) овощное пюре
- Б) мясное пюре
- В) творог
- Г) яблочное пюре

66. ГЛЮТЕН СОДЕРЖИТСЯ В КАШЕ

- А) овсяной
- Б) рисовой
- В) гречневой
- Г) кукурузной

67. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СРОК ВВЕДЕНИЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РАЦИОН РЕБЁНКА - МЕС.

- А) 7
- Б) 5
- В) 6
- Г) 9

68. РЕБЁНКУ МОЖНО ДАВАТЬ РЫБУ В КАЧЕСТВЕ ПРИКОРМА С

- А) 8-9 месяцев
- Б) 10-11 месяцев
- В) 5-6 месяцев
- Г) 1 года

69. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СРОК ВВЕДЕНИЯ ТВОРОГА В РАЦИОН РЕБЁНКА НЕ РАНЕЕ

- А) 6
- Б) 7

- В) 8
- Г) 9

70. МАЛЬАБСОРБЦИЯ РАСЩЕПЛЕННЫХ ПРОДУКТОВ ГЛИАДИНА С ОБРАЗОВАНИЕМ В КРОВИ АНТИТЕЛ К ФРАГМЕНТАМ ГЛЮТЕНА ЗЛАКОВЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СИМПТОМОМ

- А) болезни Ги - Гертера - Гейбнера и нетропического спру
- Б) порфирии
- В) галактоземии
- Г) голодания

71. ПРИ ГИПОТРОФИИ ОТМЕЧАЕТСЯ

- А) снижение тургора тканей
- Б) повышение тургора тканей
- В) повышение эластичности кожи
- Г) повышение ломкости капилляров кожи

72. СООТНОШЕНИЕ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ В РАЦИОНЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕ ГОДА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1 : 1 : 4
- Б) 1 : 2 : 3
- В) 1 : 1 : 3
- Г) 1 : 1 : 2

73. ПРИ СЕНСИБИЛИЗАЦИИ К ГРИБКОВЫМ АЛЛЕРГЕНАМ ИЗ ПИТАНИЯ РЕБЕНКА ИСКЛЮЧАЮТСЯ

- А) ферментированные сыры
- Б) соевые продукты
- В) зерновые продукты
- Г) яйца

74. ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ МЯСО В РАЦИОН РЕБЕНКА СЛЕДУЕТ ВВОДИТЬ В МЕС.

- А) 6
- Б) 7
- В) 8
- Г) 4

75. К АГЛЮТЕНОВЫМ КАШАМ ОТНОСИТСЯ

- А) гречневая
- Б) манная
- В) овсяная
- Г) ячневая

76. НАИБОЛЕЕ ВЫСОКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛАКТАЗЫ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ У

- А) детей первого года жизни
- Б) старших школьников
- В) взрослых
- Г) младших школьников

77. ЛАКТОЗА ГРУДНОГО МОЛОКА В ТОНКОЙ КИШКЕ

- А) расщепляется большей частью
- Б) расщепляется полностью
- В) расщепляется меньшей частью
- Г) не расщепляется

78. ЛАКТОЗА, НЕРАСЩЕПЛЕННАЯ В ТОНКОЙ КИШКЕ, В ТОЛСТОЙ КИШКЕ

- А) утилизируется микрофлорой кишечника

- Б) расщепляется до моносахаридов
- В) выходит неизменной с калом
- Г) расщепляется до олигосахаридов

79. К КОНЕЧНОМУ ПРОДУКТУ УТИЛИЗАЦИИ ЛАКТОЗЫ МИКРОФЛОРОЙ КИШЕЧНИКА ОТНОСЯТ

- А) короткоцепочечные жирные кислоты
- Б) моносахариды
- В) газы
- Г) молочную кислоту

80. НЕУТИЛИЗИРОВАННАЯ МИКРОФЛОРОЙ ТОЛСТОЙ КИШКИ ЛАКТОЗА СПОСОБСТВУЕТ

- А) повышению осмотического давления в кишечнике
- Б) снижению осмотического давления в кишечнике
- В) абсорбции воды из кишечника
- Г) замедлению моторики кишечника

81. С КАКИМ ФАКТОРОМ СВЯЗАНА ЧАСТОТА ТРАНЗИТОРНОЙ ЛАКТАЗНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ?

- А) большое содержание лактозы в молоке
- Б) наличие в кишечной микрофлоре аэробной флоры
- В) преобладание в кишечной микрофлоре бифидобактерий
- Г) повышенное осмотическое давление в кишечнике

82. УВЕЛИЧЕНИЕ НЕИЗМЕНЁННЫХ (НЕПЕРЕВАРЕННЫХ) МЫШЕЧНЫХ ВОЛОКОН В КОПРОГРАММЕ НАЗЫВАЕТСЯ

- А) креаторея
- Б) амилорея
- В) стеаторея
- Г) миорея

83. ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ С СИНДРОМОМ МАЛЬАБСОРБЦИИ РАЗВИВАЕТСЯ

- А) гипотрофия
- Б) паратрофия
- В) гипостатура
- Г) нанизм

84. ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА МОЛОКА У МАТЕРИ СЛЕДУЕТ

- А) увеличить частоту прикладывания ребёнка к груди
- Б) уменьшить частоту прикладывания ребёнка к груди
- В) уменьшить физические нагрузки матери
- Г) увеличить физические нагрузки матери

85. АДАПТАЦИЯ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) введение белков молочной сыворотки
- Б) увеличение содержания белка
- В) снижение содержания лактозы
- Г) введение аминокислоты серин

86. ОРГАН, ИГРАЮЩИЙ НАИБОЛЬШУЮ РОЛЬ В РАСЩЕПЛЕНИИ ЖИРОВ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ

- А) поджелудочная железа
- Б) желудок
- В) слюнные железы
- Г) тонкая кишка

87. В РАСЩЕПЛЕНИИ ЖИРОВ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ УЧАСТВУЕТ

- А) липаза
- Б) трипсиноген
- В) энтерокиназа
- Г) амилаза

88. КАКОЙ ФАКТОР СПОСОБСТВУЕТ ЭМУЛЬГИРОВАНИЮ ПОСТУПИВШИХ В ТОНКУЮ КИШКУ ЖИРОВ?

- А) свободные жирные кислоты и моноглицериды
- Б) микрофлора тонкой кишки
- В) бикарбонаты панкреатического сока
- Г) бикарбонаты кишечного сока

89. КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ РАСЩЕПЛЕНИЯ ЖИРОВ В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ ЯВЛЯЮТСЯ

- А) моноглицериды
- Б) диглицериды
- В) триглицериды
- Г) соли жирных кислот

90. ПРИ КАКОМ ТИПЕ ВСКАРМЛИВАНИЯ СТАНОВЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОГО СОСТАВА КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ ПРОИСХОДИТ БЫСТРЕЕ?

- А) грудном
- Б) искусственном
- В) смешанном
- Г) вид вскармливания не имеет значения

91. ПОТРЕБНОСТЬ В УГЛЕВОДАХ (В ГРАММАХ НА 1 КГ МАССЫ ТЕЛА) ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 12-14
- Б) 5-8
- В) 8-10
- Г) 10-12

92. У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА СЛАБО РАЗВИТЫМ ОТДЕЛОМ ЖЕЛУДКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) кардиальный
- Б) тело
- В) пилорический
- Г) антральный

93. СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ОТ 2 НЕДЕЛЬ ДО 2 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ МАССЫ ТЕЛА

- А) 1/5
- Б) 1/4
- В) 1/6
- Г) 1/7

94. ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ РЕБЁНКА 2 МЕСЯЦЕВ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 6 раз в сутки
- Б) по требованию
- В) 4 раза в сутки
- Г) 7 раз в сутки

95. ЗДОРОВОГО НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ПРИКЛАДЫВАЮТ К ГРУДИ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПУТЕМ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ

- А) 30 мин.
- Б) 2 час.
- В) 12 час.
- Г) 24 час

96. У БОЛЬШИНСТВА НОВОРОЖДЕННЫХ МЕКОНИЙ ОТХОДИТ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ _____ ДНЕЙ

- А) 1-2
- Б) 3-4
- В) 4-5
- Г) 5-6

97. У ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ ПРИ ЦЕЛИАКИИ В АКТИВНОМ ПЕРИОДЕ ИСПОЛЬЗУЮТ СМЕСИ

- А) на основе белковых гидролизатов
- Б) кисломолочные
- В) на основе белков сои
- Г) гипоаллергенные

98. НОЧНЫЕ КОРМЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ

- А) разрешаются всегда
- Б) запрещаются
- В) разрешаются лишь после консультации невролога
- Г) разрешаются, если нет срыгиваний

99. ВЫСОКИЙ ГИДРОЛИЗ БЕЛКА КОРОВЬЕГО МОЛОКА ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ СМЕСИ

- А) алфаре
- Б) фрисовом
- В) сэмпербифидус
- Г) нэнни

100. ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ РЕБЁНКА В ВОЗРАСТЕ 1 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 5 раз в сутки
- Б) по требованию
- В) 6 раз в сутки
- Г) 3 раза в сутки