

Тесты по дисциплине «пропедевтика детских болезней» для студентов 3 курса специальности
«Педиатрия»

Правильный ответ выделен полужирным шрифтом

1. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПРИБАВКА РОСТА РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ 10-12 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ (СМ)

- А) 1-1,5
- Б) 2
- В) 2,5
- Г) 3

2. СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ МАССО-РОСТОВОГО ИНДЕКСА ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 55-65
- Б) 40-55
- В) 30-35
- Г) 70-85

3. СРЕДНИЙ РОСТ РЕБЕНКА В ВОЗРАСТЕ ОДНОГО ГОДА СОСТАВЛЯЕТ (СМ)

- А) 75
- Б) 70
- В) 65
- Г) 80

4. ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ СРЕДНЯЯ ПРИБАВКА РОСТА У ДЕТЕЙ 1-3 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ (СМ)

- А) 3
- Б) 2
- В) 1
- Г) 4

5. СРЕДНЯЯ МАССА ТЕЛА ДОНОШЕННОГО РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ (ГРАММ)

- А) 3000-3500
- Б) 2500-3000
- В) 3500-4000
- Г) 4000-4500

6. РЕФЛЕКС БАБИНСКОГО ИСЧЕЗАЕТ К

- А) 2 годам
- Б) 8 месяцам
- В) 1 году
- Г) 6 месяцам

7. ДВИЖЕНИЯ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- А) хаотичностью
- Б) координированностью
- В) целенаправленностью
- Г) ограничением объема

8. МИЕЛИНИЗАЦИЯ НЕРВНЫХ ВОЛОКОН В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ К

- А) 3-5 годам

- Б) 1 году
- В) 2-3 годам
- Г) 6 месяцу

9. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ГИПЕРТОНУС МЫШЦ СГИБАТЕЛЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ ИСЧЕЗАЕТ К (МЕС.)

- А) 4
- Б) 2
- В) 6
- Г) 8

10. В КАКОМ ВОЗРАСТЕ УГАСАЕТ РЕФЛЕКС? ПОЛЗАНИЯ БАУЭРА

- А) к 4 месяцам
- Б) к концу 1 года
- В) к 6 месяцам
- Г) к концу 1 месяца

11. РЕФЛЕКС ОПОРЫ И АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОХОДКИ СОХРАНЯЕТСЯ В НОРМЕ ДО (МЕС.)

- А) 2
- Б) 6
- В) 8
- Г) 10

12. СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ НАЧАЛА УДЕРЖИВАНИЯ ГОЛОВЫ В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ (МЕС.)

- А) 1,5
- Б) 4
- В) 5
- Г) 6

13. ПРИМЕРНЫЙ ВОЗРАСТ РЕБЕНКА, ЕСЛИ ОН ИМЕЕТ РОСТ 123 СМ И МАССУ ТЕЛА 24 КГ, СОСТАВЛЯЕТ (ГОД)

- А) 7
- Б) 6
- В) 5
- Г) 8

14. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОВ РЕБЕНОК ПРОИЗНОСИТ В ВОЗРАСТЕ 1 ГОДА?

- А) 8-10
- Б) 5-6
- В) 30-40
- Г) 15-20

15. СООТНОШЕНИЕ БЕЛКОВ, ЖИРОВ И УГЛЕВОДОВ В РАЦИОНЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕ ГОДА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 1 : 1 : 4
- Б) 1 : 2 : 3
- В) 1 : 3 : 4
- Г) 2 : 3 : 4

16. ФОРМУЛА ДЛЯ РАСЧЁТА КОЛИЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ У РЕБЁНКА ДО 1 ГОДА

- А) $n - 4$
- Б) $n + 4$
- В) $4n - 20$
- Г) $20 - 2n$

17. У ДОНОШЕННОГО НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА

- А) преобладает тонус мышц-сгибателей
- Б) снижен тонус мышц-сгибателей
- В) преобладает тонус мышц-разгибателей
- Г) снижен тонус мышц-разгибателей

17. ПРОРЕЗЫВАНИЕ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ К (ГОД)

- А) 2-2,5
- Б) 3-3,5
- В) 1
- Г) 4

18. ВОЗРАСТ ЗАКРЫТИЯ БОЛЬШОГО РОДНИЧКА СОСТАВЛЯЕТ (МЕС.)

- А) 12-18
- Б) 1 -2
- В) 6-12
- Г) 18-24

19. МАЛЫЙ РОДНИЧОК ЗАКРЫВАЕТСЯ ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ К

- А) 4-8 неделям
- Б) 2 неделям
- В) 12 месяцам
- Г) 3 месяцам

20. РЕЦЕПТОРНЫЙ АППАРАТ МЫШЦ РЕБЕНКА СФОРМИРОВАН К

- А) моменту рождения
- Б) 7-9 месяцам
- В) 6-7 годам
- Г) 15 годам

21. ПРИ ПРОРЕЗЫВАНИИ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ ВНАЧАЛЕ ПОЯВЛЯЮТСЯ

- А) первые моляры
- Б) верхние боковые резцы
- В) клыки
- Г) верхние средние резцы

22. КАКОЙ ХАРАКТЕР ДЫХАНИЯ ПРОСЛУШИВАЕТСЯ У ГОДОВАЛОГО РЕБЕНКА?

- А) пуэрильное
- Б) везикулярное
- В) жесткое
- Г) бронхиальное

23. ПУЭРИЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- А) усиленным везикулярным
- Б) бронхиальным
- В) ослабленным бронхиальным
- Г) ослабленным жестким

24. ПОД ТЕРМИНОМ «ТАХИПНОЭ» ПОНИМАЮТ

- А) учащение дыхания
- Б) углубление дыхания

- В) урежение дыхания
- Г) поверхностное дыхание

25.] ЧАСТОМУ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЭМФИЗЕМЫ ЛЁГКИХ У НОВОРОЖДЕННЫХ СПОСОБСТВУЕТ НЕДОРАЗВИТИЕ

- А) эластической ткани
- Б) хрящей
- В) мышечной ткани
- Г) ацинусов

26. ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В МИНУТУ У ГОДОВАЛОГО РЕБЁНКА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 30-35
- Б) 40-60
- В) 25
- Г) 20

27. ГОРТАНЬ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ИМЕЕТ ФОРМУ

- А) воронкообразную
- Б) удлиненную
- В) бочкообразную
- Г) сосуда

28. ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В МИНУТУ У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА СОСТАВЛЯЕТ

- А) 40-60
- Б) 60-80
- В) 20-40
- Г) 20-30

29. У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЛЕВАЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СЕРДЕЧНОЙ ТУПОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) на 2 см латеральнее от левой средне-ключичной линии
- Б) по левой средне-ключичной линии
- В) по левому краю грудины
- Г) на 2 см медиальнее от левой средне-ключичной линии

30. У НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СЕРДЕЧНОЙ ТУПОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА УРОВНЕ

- А) II ребра
- Б) II межреберья
- В) III ребра
- Г) III межреберья

31. БОТАЛЛОВ ПРОТОК СОЕДИНЯЕТ

- А) лёгочную артерию с аортой
- Б) пупочную вену с нижней полой веной
- В) пупочную артерию с аортой
- Г) лёгочную артерию с пупочной веной

32. У РЕБЕНКА ПЯТИ ЛЕТ ЧАСТОТА ПУЛЬСА В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ В СРЕДНЕМ

- А) 100
- Б) 120

- В) 80
- Г) 78

33. У НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА ПРАВАЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СЕРДЕЧНОЙ ТУПОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- А) по правой парастернальной линии
- Б) на 2 см кнаружи от правой парастернальной линии
- В) по правой среднеключичной линии
- Г) на 2 см кнаружи от правой среднеключичной линии

34. У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ЧАСТОТА ПУЛЬСА В МИНУТУ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 140-160
- Б) 100-120
- В) 80-100
- Г) 60-80

35. ДЛЯ РАСЧЕТА СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У РЕБЁНКА СТАРШЕ 1 ГОДА ИСПОЛЬЗУЮТ ФОРМУЛУ

- А) $90 + 2n$
- Б) $60 + n$
- В) $80 + (n - 2)$
- Г) $100 + 2n$

36. КРАЙ ПЕЧЕНИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ РАСПОЛОЖЕН НИЖЕ КРАЯ РЕБЕРНОЙ ДУГИ У РЕБЕНКА ДО (ГОД)

- А) 5-7
- Б) 1-3
- В) 3-5
- Г) 8-10

37. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ЖЕЛУДКА У РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ (МЛ)

- А) 7-10
- Б) 20-30
- В) 35-50
- Г) 3-6

38. ОБЪЕМ ПИТАНИЯ РЕБЕНКА 6-12 МЕСЯЦЕВ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ (МЛ/СУТКИ)

- А) 1000
- Б) 800
- В) 1200
- Г) 1400

39. ПОТРЕБНОСТЬ В УГЛЕВОДАХ (В ГРАММАХ НА 1 КГ МАССЫ ТЕЛА) ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 12-14
- Б) 5-8
- В) 8-10
- Г) 10-12

40. АБСОЛЮТНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ГРУДНОМУ ВСКАРМЛИВАНИЮ СО СТОРОНЫ РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) галактоземия
- Б) фенилкетонурия
- В) целиакия
- Г) первичная лактазная недостаточность

41. ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЛКАХ ДЛЯ РЕБЁНКА 0-3 МЕСЯЦЕВ (Г/КГ/СУТКИ) ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2,2
- Б) 2,0
- В) 2,9
- Г) 2,6

42. СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА В ГРУДНОМ МОЛОКЕ СОСТАВЛЯЕТ (Г/100 МЛ)

- А) 1,2
- Б) 2,0
- В) 2,8
- Г) 3,5

43. СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 4-6 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ МАССЫ ТЕЛА

- А) 1/7
- Б) 1/4
- В) 1/5
- Г) 1/6

44. ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЛКАХ (Г/КГ/СУТКИ) ДЛЯ РЕБЁНКА 7-12 МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2,9
- Б) 2,2
- В) 3,5
- Г) 2,6

45. СРЕДНЕЕ ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ ЗА СУТКИ РЕБЕНКА ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 5
- Б) 4
- В) 6
- Г) 7

46. ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ ГИПОГАЛАКТИИ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕФИЦИТУ МОЛОКА ДО (%)

- А) 25
- Б) 10
- В) 40
- Г) 50

47. СУТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ОТ ДВУХ НЕДЕЛЬ ДО ДВУХ МЕСЯЦЕВ СОСТАВЛЯЕТ _____ МАССЫ ТЕЛА

- А) 1/5
- Б) 1/4
- В) 1/6
- Г) 1/7

48. ПОТРЕБНОСТЬ РЕБЕНКА 4-6 МЕС. В БЕЛКАХ (Г/КГ/СУТ) ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2,6
- Б) 2,0
- В) 2,9
- Г) 3,2

49. ДЕФИЦИТ МОЛОКА В % ПРИ ГИПОГАЛАКТИИ 2 СТЕПЕНИ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 50
- Б) 25
- В) 40
- Г) 75

50. АДАПТАЦИЯ МОЛОЧНОЙ СМЕСИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- А) введение белков молочной сыворотки
- Б) увеличение содержания белка
- В) снижение содержания лактозы
- Г) введение аминокислоты серин

51. ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ РЕБЕНКА С АЛЛЕРГИЕЙ НА БЕЛОК КОРОВЬЕГО МОЛОКА СЛЕДУЕТ НАЗНАЧАТЬ СМЕСИ

- А) на основе полного гидролиза белка
- Б) адаптированные молочные
- В) безлактозные
- Г) кисломолочные

52. ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ РЕБЁНКА В ВОЗРАСТЕ 1 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ

РАЗ/РАЗА В СУТКИ

- А) 5
- Б) 8
- В) 7
- Г) 3

53. ЧИСЛО КОРМЛЕНИЙ РЕБЁНКА ДВУХ МЕСЯЦЕВ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ

ВСКАРМЛИВАНИИ СОСТАВЛЯЕТ _____ РАЗ В СУТКИ

- А) 6
- Б) 8
- В) 5
- Г) 7

54. СООТНОШЕНИЕ КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В ЖЕНСКОМ МОЛОКЕ СОСТАВЛЯЕТ

- А) 2 : 1
- Б) 1 : 2
- В) 1 : 1
- Г) 3 : 2

55. ПЕРВЫМ ПРИКОРМОМ ПРИ ЕСТЕСТВЕННОМ ВСКАРМЛИВАНИИ РЕБЕНКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ВВОДИТЬ

- А) овощное пюре
- Б) мясное пюре
- В) творог
- Г) яблочное пюре

56. ГЛЮТЕН СОДЕРЖИТСЯ В КАШЕ

- А) овсяной

- Б) рисовой
- В) гречневой
- Г) кукурузной

57. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СРОК ВВЕДЕНИЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ В РАЦИОН РЕБЁНКА (МЕС.)

- А) 7
- Б) 5
- В) 6
- Г) 9

58. РЕБЁНКУ МОЖНО ДАВАТЬ РЫБУ В КАЧЕСТВЕ ПРИКОРМА С (МЕС.)

- А) 8-9
- Б) 10-11
- В) 5-6
- Г) 12

59. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СРОК ВВЕДЕНИЯ ТВОРОГА В РАЦИОН РЕБЁНКА НЕ РАНЕЕ (МЕС.)

- А) 6
- Б) 7
- В) 8
- Г) 9

60. ПОКАЗАТЕЛИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (НПР) (РА - РЕЧЕВАЯ АКТИВНОСТЬ) ДЕТЕЙ В 1 ГОД - 1 ГОД 3 МЕСЯЦА ВКЛЮЧАЮТ

А) использование облегченных слов («би-би», «ав-ав») Б)

знание 10 слов, легкое подражание новым слогам

В) использование двухсловных предложений

Г) построение словосочетаний из двух слов

61. ПОКАЗАТЕЛИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (НПР) (ДО - ДВИЖЕНИЯ ОБЩИЕ) ДЕТЕЙ В 1 ГОД - 1 ГОД 3 МЕСЯЦА ВКЛЮЧАЮТ

А) длительное хождение, изменение положения (приседает, наклоняется)

Б) умение ходить по поверхности шириной 15-20 см на высоте от пола 15-20 см

В) перешагивание через препятствия чередующимся шагом

Г) перешагивание через препятствия высотой 10-15 см или длиной 35 см чередующимся шагом

62. КРИТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ПЛОДА СОСТАВЛЯЕТ (НЕДЕЛЯ)

- А) 3-12
- Б) 14-20
- В) 22-26
- Г) 28-32

63. СРЕДНЯЯ ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА ЗА ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ (ГРАММ)

- А) 600
- Б) 250
- В) 400

64. К III ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ДЕТИ

- А) страдающие хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, с редкими обострениями
- Б) с нормальным физическим и психическим развитием, не имеющие анатомических дефектов и функциональных отклонений
- В) без хронических заболеваний, но имеющие некоторые функциональные нарушения
- Г) страдающие хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, с частыми обострениями

65. ИДЕАЛЬНОЙ ПИЩЕЙ ДЛЯ ГРУДНОГО РЕБЕНКА ЯВЛЯЕТСЯ

- А) молоко матери
- Б) адаптированная молочная смесь
- В) пастеризованное козье молоко
- Г) пастеризованное коровье молоко

66. СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ «НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ ВСКАРМЛИВАНИЯ» ПРИКОРМЫ СЛЕДУЕТ ВВОДИТЬ С (МЕС.)

- А) 4-6
- Б) 6-8
- В) 5-8
- Г) 8-10

67. ОБЪЕМ ПИТАНИЯ НА СУТКИ РЕБЕНКУ В ВОЗРАСТЕ С 10 ДНЕЙ ДО 2 МЕСЯЦЕВ ОПРЕДЕЛЯЮТ ИЗ РАСЧЕТА _____ ДОЛЖЕНСТВУЮЩЕЙ МАССЫ ТЕЛА

- А) 1/5
- Б) 1/6
- В) 1/7
- Г) 1/8

68. ЗРЕЛОСТЬ НОВОРОЖДЕННОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО

- А) степени морфофункционального развития
- Б) соматометрическим показателям новорожденного
- В) сроку гестации и массе тела новорожденного
- Г) сроку гестации и длине тела новорожденного

69. К КРИТЕРИЯМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ЗДОРОВЬЕ, ОТНОСЯТ

- А) наличие или отсутствие функциональных нарушений
- Б) факторы риска биологического анамнеза
- В) факторы риска генеалогического анамнеза
- Г) факторы риска социального анамнеза

70. ГОТОВЫМИ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ПО ТЕСТУ КЕРНА - ЙЕРАСЕКА СЧИТАЮТСЯ ДЕТИ ПРИ НАЛИЧИИ (БАЛЛ)

- А) 3-6
- Б) 6-7
- В) 7-9
- Г) 10

71. В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ САМУЮ БОЛЬШУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ АКТИВНОСТЬ

- А) речи
- Б) двигательная

- В) общения с другими детьми
- Г) познавательная

72. У НОВОРОЖДЁННОГО РЕБЁНКА ВЕРХНЯЯ ГРАНИЦА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ СЕРДЕЧНОЙ ТУПОСТИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА УРОВНЕ

- А) II ребра
- Б) II межреберья
- В) III ребра
- Г) III межреберья

73. БОТАЛЛОВ ПРОТОК СОЕДИНЯЕТ

- А) лёгочную артерию с аортой
- Б) пупочную вену с нижней полой веной
- В) пупочную артерию с аортой
- Г) лёгочную артерию с пупочной веной

74. СРЫГИВАНИЯ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА ОБУСЛОВЛЕННЫ НЕДОРАЗВИТИЕМ

- А) кардиального отдела желудка
- Б) дна желудка
- В) пилорического отдела желудка Г) тела желудка

75. КРАЙ ПЕЧЕНИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ РАСПОЛОЖЕН НИЖЕ КРАЯ РЕБЕРНОЙ ДУГИ У РЕБЕНКА ДО (ГОД)

- А) 5-7
- Б) 1 -3
- В) 3-5
- Г) 8-10

76. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ ЖЕЛУДКА У РЕБЕНКА ПРИ РОЖДЕНИИ СОСТАВЛЯЕТ (МЛ)

- А) 7-10
- Б) 20-30
- В) 35-50
- Г) 3-6

77. КАКОЙ БЕЛОК ТРАНСПОРТИРУЕТ ЖЕЛЕЗО ИЗ КРОВИ В КОСТНЫЙ МОЗГ?

- А) трансферрин
- Б) ферритин
- В) гемосидерин
- Г) миоглобин

78. КРИТЕРИЕМ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ У ДЕТЕЙ ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 5 ЛЕТ ПО НОРМАТИВАМ ВОЗ (ПО ВЕНОЗНОЙ КРОВИ) ЯВЛЯЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ГЕМОГЛОБИНА МЕНЕЕ (Г/Л)

- А) 110
- Б) 100
- В) 120
- Г) 90

79. К III ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ДЕТИ

- А) страдающие хроническими заболеваниями в стадии ремиссии, с редкими обострениями
- Б) с нормальным физическим и психическим развитием, не имеющие анатомических дефектов и функциональных отклонений
- В) без хронических заболеваний, но имеющие некоторые функциональные нарушения

- Г) страдающие хроническими заболеваниями в стадии субкомпенсации, с частыми обострениями
80. К ЦЕНТРАЛЬНЫМ ОРГАНАМ ЛИМФАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ
- А) селезенка и костный мозг
 - Б) тимус и костный мозг
 - В) эпифиз и гипофиз
 - Г) пейеровы бляшки
81. ВОЗРАСТНАЯ ИНВОЛЮЦИЯ МИНДАЛИН НАЧИНАЕТСЯ С
- А) юношеского возраста
 - Б) подросткового возраста
 - В) раннего детства
 - Г) сразу после рождения
82. ОЧАГИ КРОВЕТВОРЕНИЯ ПЕЧЕНИ ИСЧЕЗАЮТ К
- А) периоду новорожденности
 - Б) 1 месяцу после рождения
 - В) 3 неделям внутриутробной жизни
 - Г) 3 месяцам внутриутробной жизни
83. ПРИ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ПРОТЕИНУРИИ ВЕРОЯТНО ПОРАЖЕНИЕ
- А) клубочков
 - Б) петель Генле
 - В) дистальных канальцев
 - Г) собирательных трубочек
84. ПРОРЕЗЫВАНИЕ ВСЕХ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ К ВОЗРАСТУ (В ГОДАХ):
- А) 1–1,5
 - Б) 1,5–2
 - В) 2–2,5
 - Г) 2,5–3
85. СУТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЫДЕЛЯЕМОЙ МОЧИ ОТ СУТОЧНОГО КОЛИЧЕСТВА ПРИНЯТОЙ ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ:
- А) $1/3 - 1/5$
 - Б) $1/3 - 1/2$
 - В) $2/3 - 3/4$
 - Г) соответствует количеству выпитой жидкости
86. ЧИСЛО МОЧЕИСПУСКАНИЙ В СУТКИ У РЕБЕНКА 1 МЕС СОСТАВЛЯЕТ:
- А) 10
 - Б) 15
 - В) 20
 - Г) 25
87. ВТОРОЙ ПЕРЕКРЕСТ В ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЕ КРОВИ У ДЕТЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ:
- А) 4-5 месяцев
 - Б) 1 год
 - В) 4-5 лет
 - Г) 6-8 лет
88. К ПЛОДУ ОТ МАТЕРИ ТРАНСПЛАЦЕНТАРНО ПЕРЕХОДЯТ ИММУНОГЛОБУЛИНЫ КЛАССА
- А) А

- Б) М
- В) G
- Г) E

89. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО БЕЛКА (Г/Л) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 1-ГО ГОДА СОСТАВЛЯЕТ:

- А) 30-40
- Б) 40-50
- В) 50-60
- Г) 60-80

90. ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДЕ (МЛ/КГ) РЕБЕНКА 10 ЛЕТ СОСТАВЛЯЕТ:

- А) 40-50
- Б) 70-80
- В) 90-100
- Г) 110-130

91. СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО КАЛЬЦИЯ (ММОЛЬ/Л) В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ДЕТЕЙ СОСТАВЛЯЕТ:

- А) 2.0-2.7
- Б) 2.25-2.7
- В) 2.5-3.0
- Г) 2.7-3.5

92. ПОТРЕБНОСТЬ В ВОДЕ (МЛ/КГ) ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА СОСТАВЛЯЕТ:

- А) 40-50
- Б) 70-80
- В) 100-120
- Г) 130-150

93. ОСНОВНЫМ УГЛЕВОДОМ В ПИТАНИИ РЕБЕНКА 1-ГО ПОЛУГОДИЯ ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ:

- А) крахмал
- Б) сахароза
- В) лактоза
- Г) мальтоза

94. У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ЛЕТ ЖИЗНИ ДОМИНИРУЮТ ГОРМОНЫ С:

- А) катаболическим эффектом
- Б) анаболическим эффектом
- В) анаболическим и катаболическим эффектом

95. НАИБОЛЕЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ИММУНОГЛОБУЛИНА G ИМЕЮТ ДЕТИ (ВОЗРАСТ В МЕС):

- А) 0-3
- Б) 3-6
- В) 6-9
- Г) 9-12

96. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИМФОЦИТОЗ У ДЕТЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ В ВОЗРАСТЕ:

- А) первых 3-х дней
- Б) первых 4-5 лет
- В) младших школьников
- Г) старших школьников

97. КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ ($\times 10^9/\text{л}$) У ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ СОСТАВЛЯЕТ:

- А) 5-6
- Б) 7-12
- В) 13-15
- Г) 16-20

98. У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 1 ГОДА ВЕЛИЧИНА КЛУБОЧКОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ (КЛИРЕНС ПО ЭНДОГЕННОМУ КРЕАТИНИНУ В МЛ/МИН) СОСТАВЛЯЕТ:

- А) 60 ± 20
- Б) 80 ± 20
- В) 100 ± 20
- Г) 120 ± 20

99. ЧИСЛО МОЧЕИСПУСКАНИЙ ЗА СУТКИ У ШКОЛЬНИКОВ ОРИЕНТИРОВОЧНО СОСТАВЛЯЕТ:

- А) 1-2
- Б) 3-5
- В) 6-7
- Г) 7-10

100. СУТОЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ МОЧИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕ 1 ГОДА СОСТАВЛЯЮТ:

- А) 1001–1010
- Б) 1005–1015
- В) 1005–1025
- Г) 1010–1020