

Тесты по дисциплине «детская хирургия» для студентов специальности «Лечебное дело».
Правильный ответ выделен полужирным шрифтом.

1. Неосложненная пахово-мошоночная грыжа характеризуется
 - А) выраженным болевым синдромом
 - Б) расширением наружного пахового кольца
 - В) безболезненным невправимым образованием
 - Г) симптомом просвечивания при диафаноскопии
2. Дифференциальную диагностику язвенной болезни желудка у детей чаще всего проводят с
 - А) аппендицитом
 - Б) инфарктом миокарда
 - В) гастритом
 - Г) почечной коликой
3. При осмотре новорожденного заподозрить наличие пилоростеноза позволит
 - А) пальпаторное обнаружение увеличенного привратника
 - Б) гастродуоденоскопия
 - В) рентгенография желудка барием
 - Г) аускультация брюшной полости
4. Больным с подозрением на острый аппендицит показано проведение
 - А) рентгеноконтрастного исследования
 - Б) компьютерной томографии
 - В) ультразвукового исследования брюшной полости
 - Г) аноректальной манометрии
5. В настоящее время оптимальным методом лечения острого аппендицита у детей является аппендэктомия
 - А) лапароскопическая
 - Б) с помощью аппарата «Da Vinci»
 - В) инвагинационная
 - Г) внутрипросветная эндоскопическая
6. Если у ребенка, оперированного год назад по поводу перитонита, появились жалобы на боли в животе, рвоту, задержку стула, то обследование начинают с
 - А) обзорной рентгенографии брюшной полости стоя
 - Б) введения зонда в желудок
 - В) ректального исследования пальцем
 - Г) ирригографии с воздухом
7. При развитии диареи у ребенка с подтвержденным диагнозом «болезнь Гиршпрунга» прежде всего следует думать о
 - А) развитии синдрома нарушенного всасывания
 - Б) присоединении вирусной инфекции с кишечным синдромом
 - В) Гиршпрунг-ассоциированном энтероколите
 - Г) развитии дисфункции поджелудочной железы
8. Уточнить заболевание у ребенка двух лет, страдающего хроническим запором с первых дней жизни, у которого дефекация только после клизмы, позволит
 - А) ирригография с бариевой взвесью
 - Б) колоноскопия
 - В) ирригография с воздухом
 - Г) обзорная рентгенография брюшной полости
9. В ближайшем послеоперационном периоде после операции по поводу грыжи белой линии живота рекомендуют

- А) соблюдение домашнего режима
- Б) лечебную физкультуру
- В) физиотерапевтическое лечение
- Г) постельный режим

10. К симптомам, характерным для второй стадии травмы органов брюшной полости и забрюшинного пространства у новорожденных детей, прорыва подкапсульной гематомы, относят

- А) увеличение органа в размере
- Б) пальпируемое новообразование, свободно перемещаемое по брюшной полости
- В) выраженную бледность
- Г) умеренную анемию

11. Причиной болезни Гиршпрунга считают

- А) отсутствие нервных ганглиев в Мейснеровском и Ауэрбаховском сплетениях стенки толстой кишки
- Б) нарушение питания ребенка
- В) низкую кишечную непроходимость
- Г) перенесенные кишечные инфекции

12. Если у ребенка с болезнью Гиршпрунга по данным ирригографии переходная зона располагается на уровне сигмовидной кишки, то диагностируют ____ форму заболевания

- А) ректальную
- Б) короткую
- В) субтотальную
- Г) ректо-сигмоидную

13. При болезни Гиршпрунга чаще всего поражается

- А) восходящая кишка
- Б) сигмовидная кишка
- В) дуоденоюнальный переход
- Г) слепая кишка

14. Странгуляционная кишечная непроходимость возникает при

- А) ущемленной грыже
- Б) мекониевом илеусе
- В) атрезии тощей кишки
- Г) болезни Гиршпрунга

15. Тактика лечения при ущемленной паховой грыже у мальчиков в первую очередь определяется

- А) наличием сопутствующего заболевания
- Б) давностью ущемления
- В) возрастом
- Г) размером грыжевого выпячивания

16. Для грыжи белой линии живота наиболее характерным признаком является наличие

- А) приступообразных болей в животе
- Б) диспепсических явлений
- В) тошноты, рвоты
- Г) апоневротического дефекта по средней линии

17. Основным симптомом острого аппендицита является

- А) боль
- Б) гипертермия
- В) дизурия
- Г) рвота

18. Симптомом, которым проявляется пилороспазм, является

- А) полиурия
- Б) рвота в горизонтальном положении
- В) срыгивание молоком с рождения
- Г) рвота створоженным молоком с 3-4-й недели

19. К ведущим симптомам полной кишечной непроходимости относят

- А) выделение крови из прямой кишки и асимметрию живота
- Б) отсутствие стула и газов, рвоту с патологическими примесями
- В) рвоту пищей и асимметрию живота
- Г) постоянную тошноту и повторную рвоту съеденной пищей

20. Клинические симптомы при врожденном пилоростенозе появляются на _____ после рождения

- А) 1-2 день
- Б) 3-4 неделе
- В) 7-10 день
- Г) 5-6 день

21. Достоверным симптомом пахово-мошоночной грыжи у детей старше трех лет является

- А) выраженный болевой синдром
- Б) просвечивание при диафаноскопии
- В) положительный симптом «кашлевого» толчка
- Г) безболезненное невправимое образование

22. Наличие на ультразвуковом исследовании органов мошонки петель кишок является признаком

- А) грыжи
- Б) крипторхизма
- В) гидроцеле
- Г) варикоцеле

23. К наиболее характерным симптомам паховой грыжи относят

- А) эластическое выпячивание в паховой области
- Б) тошноту и рвоту
- В) подъем температуры
- Г) боль в животе

24. К наиболее характерным изменениям картины крови при остром аппендиците относят

- А) гиперлейкоцитоз
- Б) умеренный лейкоцитоз и нейтрофильный сдвиг формулы влево
- В) лейкопению
- Г) ускоренную СОЭ

25. Для острого аппендицита характерна поза пациента лежа на

- А) животе, отведя левую ногу в сторону и согнув в колене
- Б) правом боку с приведенными к животу ногами
- В) спине с согнутыми в коленях ногами
- Г) левом боку, приведя к животу правую ногу

26. Оптимальной комбинацией препаратов при тяжелой форме аппендикулярного перитонита является

- А) цефалоспорины+антигистаминные препараты
- Б) цефалоспорины+противогрибковые препараты
- В) цефалоспорины+аминогликозиды+метродиазол
- Г) аминогликозиды+ метронидазол

27. Осложнением паховой грыжи является

- А) ущемление
- Б) орхит

- В) атрофия яичка
- Г) перекрут яичка

28. Наиболее частым осложнением после операции по поводу больших грыж белой линии живота является

- А) расхождение швов
- Б) кровотечение
- В) нагноение послеоперационных швов
- Г) рецидив

29. Признаки субтотальной формы Гиршпрунга появляются

- А) в период новорожденности
- Б) с 1-3 месяц жизни
- В) с 3-6 месяц жизни
- Г) в период второго полугодия

30. Больным с подозрением на острый аппендицит показано проведение

- А) компьютерной томографии
- Б) ультразвукового исследования брюшной полости
- В) рентгеноконтрастного исследования
- Г) аноректальной манометрии

31. Для клинической картины острого аппендицита характерно наличие

- А) симптома Данса
- Б) локальной болезненности
- В) симптома Шоффара
- Г) симптома исчезновения печеночной тупости

32. Перистальтика желудка при пилоростенозе

- А) постоянна
- Б) эпизодична
- В) ослаблена
- Г) усилена

33. При остром аппендиците для проведения антибиотикопрофилактики целесообразно использовать цефалоспорины ____ поколения в сочетании с метронидазолом

- А) II
- Б) I
- В) III
- Г) IV

34. Перитонит с вовлечением в воспалительный процесс до двух анатомических областей брюшной полости является

- А) диффузным
- Б) местным
- В) локальным
- Г) отграниченным

35. Детям с болезнью Гиршпрунга обязательным является исследование кала на наличие

- А) патогенных штаммов *Escherichia coli*
- Б) токсинов *Clostridium difficile*
- В) роста *Candida albicans*
- Г) избыточного роста *Staphylococcus aureus*

36. К наиболее вероятным причинам формирования грыжи белой линии живота относят

- А) родовую травму
- Б) дисплазию соединительной ткани

- В) воспалительные заболевания передней брюшной стенки
- Г) слабость мышц передней брюшной стенки

37. У детей с перитонитом возникновение двс-синдрома связано с

- А) печёночной недостаточностью
- Б) поражением дыхательного центра
- В) нарушением церебральной гемодинамики
- Г) метаболическим ацидозом

38. К клиническим признакам высокой кишечной непроходимости у новорожденного ребенка относят

- А) мелену
- Б) пенистое отделяемое из носа и рта
- В) рвоту «кофейной гущей»
- Г) быстрое снижение массы тела ребенка

39. Одним из основных факторов развития илеоцекальной инвагинации у детей до 1 года является

- А) функциональное нарушение координации кишечной моторики с преобладанием сокращений циркулярного мышечного слоя кишечной стенки
- Б) функциональное нарушение координации кишечной моторики с преобладанием сокращений продольного мышечного слоя кишечной стенки
- В) приобретенная патология со стороны органов брюшной полости
- Г) врожденная патология со стороны органов брюшной полости

40. К прогрессированию пареза кишечника при перитоните приводит дефицит ионов

- А) калия
- Б) хлора
- В) натрия
- Г) кальция

41. Согласно морфологической классификации острых форм аппендицита описательная характеристика: аппендикс отечен у верхушки, серозная оболочка его гиперемирована, признаков деструкции не определяется – соответствует _____ форме острого аппендицита

- А) гангренозной
- Б) гангренозно-перфоративной
- В) катаральной
- Г) флегмонозной

42. При кровотечении, предположительно связанным с дивертикулом меккеля, обследование следует начать с

- А) радиоизотопного исследования
- Б) фиброколоноскопии
- В) лапароскопии
- Г) рентгенографии пищеварительного тракта с барием

43. Этиологическим фактором формирования косой паховой грыжи у детей является

- А) повышенное внутрибрюшное давление
- Б) слабость передней брюшной стенки
- В) расширение наружного пахового кольца
- Г) незаращение вагинального отростка

44. При тотальном ателектазе легкого аускультативно

- А) выслушивается шум трения плевры
- Б) дыхание не проводится
- В) отмечается бронхиальный тип дыхания

Г) дыхание ослаблено

45. Пилоростеноз дифференцируют с

- А) ахалазией пищевода
- Б) кистозным панкреатитом
- В) кистой желчного протока
- Г) артерио-мезентеральной непроходимостью

46. При подозрении на кровоточащую стрессовую язву желудка показано проведение

- А) фиброэзофагогастродуоденоскопии
- Б) радиоизотопного исследования
- В) ангиографии
- Г) зондирования желудка

47. Наиболее целесообразным методом лечения ребенка 8 лет, у которого после травмы грудной клетки простой гемоторакс, является

- А) дренирование плевральной полости по Бюлау
- Б) радикальная операция
- В) плевральная пункция
- Г) дренирование плевральной полости с активной аспирацией

48. К клиническим проявлениям врожденной низкой кишечной непроходимости у новорожденного ребенка относят

- А) вздутие живота, отсутствие стула и газов
- Б) бессимптомное течение
- В) пенистое отделяемое из носа и рта
- Г) рвоту «фонтаном»

49. Наиболее частой причиной тонко-тонкокишечной инвагинации является

- А) респираторно-вирусная инфекция
- Б) возрастная дискоординация перистальтики
- В) органическая (дивертикул, полип, опухоли, гематома стенки кишки)
- Г) изменение или нарушение режима питания

50. Наиболее частой причиной кишечной инвагинации у детей старше 1 года является

- А) органическая причина
- Б) возрастная дискоординация перистальтики
- В) изменение или нарушение режима питания
- Г) вирусная инфекция с кишечным синдромом

51. При физикальном обследовании ребенка с врожденной низкой кишечной непроходимостью отмечается наличие

- А) увеличения размеров печени и селезенки
- Б) общего отека живота
- В) смещения тонов сердца вправо, аускультации кишечных шумов в грудной клетке
- Г) резко выраженного вздутия и болезненной пальпации живота во всех отделах

52. Ребенку 6 лет с диагнозом «паховая грыжа» показано проведение

- А) планового оперативного вмешательства
- Б) оперативного лечения в старшем школьном возрасте
- В) консервативной терапии
- Г) экстренного оперативного вмешательства

53. Наиболее грозным ранним осложнением после плановой операции по поводу паховой грыжи является

- А) рецидив заболевания
- Б) кровотечение

- В) варикоцеле
- Г) гидроцеле

54. После неосложненной пилоромии назначают _____ питание

- А) постоянное капельное; через желудочный зонд
- Б) дробное; через 6 часов после операции с интервалом 2 часа
- В) дробное; по 5 мл с первых суток после операции
- Г) дробное по форсированной схеме; через 3 часа после операции по 20 мл с интервалом 2 часа

55. Дифференциальную диагностику неосложненной пахово-мошоночной грыжи проводят с

- А) варикоцеле
- Б) орхоэпидидимитом
- В) перекрутом гидатиды Морганьи
- Г) водянкой яичка

56. Острый аппендицит обычно начинается с

- А) диспепсических расстройств
- Б) тошноты, рвоты
- В) боли в животе
- Г) задержки стула

57. Наличие выраженных изменений в общеклинических анализах свидетельствует о _____ течении болезни Гиршпрунга

- А) компенсированном
- Б) субкомпенсированном
- В) неконтролируемом
- Г) декомпенсированном

58. Ребёнку в возрасте 10 лет на 4 сутки после абдоминальной операции при явлениях ранней спаечной непроходимости кишечника необходимо назначить

- А) консервативную терапию
- Б) наблюдение
- В) операцию в плановом порядке
- Г) срочную операцию

59. Принцип хирургического вмешательства при болезни Гиршпрунга заключается в

- А) расширяющей пластике стенозированного участка кишки
- Б) удалении патологически измененного участка кишки
- В) удалении расширенного участка толстой кишки
- Г) формировании обходного колоанального анастомоза

60. Наиболее достоверными признаками острого аппендицита у детей являются боль в животе, напряжение мышц брюшной стенки и

- А) рвота
- Б) симптом Щеткина – Блюмберга
- В) высокая лихорадка
- Г) локальная болезненность

61. К наиболее частым причинам низкой кишечной непроходимости относится

- А) врожденная атрезия тонкой кишки
- Б) поликистоз почек
- В) врожденная диафрагмальная грыжа
- Г) дупликационная киста пищевода

62. При пупочной грыже проводят операцию в возрасте

- А) 3-5 лет
- Б) 1-6 месяцев

- В) 2 лет
- Г) 1 года

63. Конгломерат органов брюшной полости, сформированный вокруг аппендикса с наличием в нем воспалительного процесса, называют

- А) забрюшинной флегмоной
- Б) кишечным инвагинатом
- В) аппендикулярным абсцессом
- Г) аппендикулярным инфильтратом

64. Смещение средостения в здоровую сторону диафрагмы вниз характерно для

- А) пневмомедиастинума
- Б) абсцесса легкого
- В) ателектаза легкого
- Г) напряженного пневмоторакса

65. Ребенку при болезненном инфильтрате по ходу зашитой раны после аппендэктомии рекомендуют

- А) курс физиотерапии
- Б) снятие единого шва и проведение ревизии раны зондом
- В) назначение антибиотиков
- Г) наблюдение

66. Тактикой врача-детского хирурга при выявлении неосложненной паховой грыжи у ребенка 4 месяцев является

- А) экстренное оперативное вмешательство
- Б) плановое грыжесечение
- В) плановое грыжесечение в 5 лет
- Г) диспансерное наблюдение до года

67. Наиболее информативным методом диагностики аппендицита является

- А) УЗИ
- Б) лапароскопия
- В) компьютерная томография
- Г) рентгенография

68. У больного пилоростенозом наблюдается _____ массы тела

- А) неравномерное увеличение
- Б) прогрессирующее падение
- В) малая прибавка
- Г) возрастной дефицит

69. Ведущим клиническим симптомом перфорации кишечника при перкуссии является

- А) неравномерность перкуторного звука
- Б) укорочение перкуторного звука
- В) притупление звука над всей поверхностью брюшной полости
- Г) отсутствие печеночной тупости

70. Дальнейшее исследование ребенка 7 лет с травмой живота, у которого перкуторно отмечено исчезновение печеночной тупости, должно включать

- А) ультразвуковое исследование
- Б) лапароскопию
- В) лапароцентез
- Г) обзорную рентгенографию брюшной полости

71. Наиболее характерным признаком механической кишечной непроходимости по обзорной рентгенограмме брюшной полости считают

- А) свободный газ в брюшной полости
- Б) увеличенный газовый пузырь желудка
- В) множественные мелкие уровни
- Г) единичные широкие уровни

72. Для ранней клинической картины кишечной инвагинации характерно наличие

- А) жидкого стула без примесей
- Б) пальпируемого инвагината в прямой кишке
- В) ослабленной перистальтики
- Г) приступообразных болей в животе

73. Наиболее достоверным методом диагностики пилоростеноза является

- А) эндоскопия
- Б) тщательный сбор анамнеза
- В) пальпация живота под наркозом
- Г) выявление симптома «песочных часов»

74. При пальцевом ректальном осмотре ребенка с подозрением на болезнь Гиршпрунга характерным признаком является

- А) выраженное расширение ампулы прямой кишки
- Б) пустая ампула на фоне длительной задержки стула
- В) снижение тонуса анального сфинктера
- Г) наличие плотного калового камня в просвете прямой кишки

75. Под дивертикулом Меккеля понимают

- А) рудимент желточного протока
- Б) новообразование кишечника
- В) рудимент урахуса
- Г) полип кишки

76. При врожденном пилоростенозе назначают

- А) серозно-мышечную пилоротомию по Фреде – Рамштедту
- Б) бужирование
- В) наложение обходного анастомоза
- Г) консервативное лечение

77. Если ребенок 2 лет страдает хроническим запором с первых дней жизни, то для уточнения диагноза назначают

- А) обзорную рентгенографию брюшной полости
- Б) ирригографию с бариевой взвесью
- В) дачу бариевой взвеси через рот
- Г) ирригографию с воздухом

78. Запоры у детей с болезнью Гиршпрунга появляются

- А) сразу после рождения
- Б) на втором году жизни
- В) с шести месяцев жизни
- Г) на третьем году жизни

79. При отсутствии эффекта от пассивного дренирования плевральной полости при пневмотораксе, следующим этапом выполняют

- А) торакотомию
- Б) активное дренирование
- В) торакоскопию
- Г) бронхоскопию

80. Кровотоочащий дивертикул Меккеля отличается от кишечной инвагинации

- А) пальпируемой опухолью в брюшной полости
- Б) отсутствием болевого синдрома
- В) необильным кровотечением со слизью
- Г) наличием болевого синдрома

81. При осмотре новорожденного заподозрить наличие пилоростеноза позволит

- 1) пальпаторное обнаружение увеличенного привратника
- 2) гастродуоденоскопия
- 3) рентгенография желудка барием
- 4) аускультация брюшной полости

82. Для выявления объективных местных симптомов острого аппендицита у детей до трех лет применяют

- А) электромиографию
- Б) осмотр во время естественного сна
- В) фиксацию ребенка
- Г) рентгеновскую компьютерную томографию

83. Первичной структурой аппендикса, вовлеченной в острый воспалительный процесс при развитии острого аппендицита, является

- А) баугиниева заслонка
- Б) серозный слой
- В) мышечный слой
- Г) слизистая оболочка

84. К основной причине возникновения внутригрудного напряжения относят

- А) двухстороннее поражение легких
- Б) повышенное стояние обоих куполов диафрагмы
- В) смещение органов средостения в пораженную сторону
- Г) смещение органов средостения в условно здоровую сторону

85. При кровотечении из прямой кишки требуется выполнить

- А) радиоизотопное исследование
- Б) рентгенографию пищеварительного тракта
- В) фиброколоноскопию
- Г) ангиографию

86. Ведущим клиническим симптомом пилоростеноза является

- А) склонность к запорам
- Б) рвота «фонтаном»
- В) желтуха
- Г) полиурия

87. Геморрагический синдром (кровянистые выделения) при кишечной инвагинации обусловлен

- А) тромбозом сосудов брыжейки
- Б) развитием ДВС-синдрома
- В) диапедезом эритроцитов в просвет кишки
- Г) разрывом сосудов слизистой оболочки кишки

88. Противопоказанием к аппендэктомии является

- А) гангренозно-перфоративный аппендицит
- Б) аппендикулярный абсцесс
- В) инфекционный шок
- Г) рыхлый аппендикулярный инфильтрат

89. Рентгенологическим признаком механической кишечной непроходимости считают

- А) уровни жидкости в кишечных петлях
- Б) равномерное повышенное газонаполнение кишечника
- В) свободный газ в брюшной полости
- Г) наличие уровня жидкости в свободной брюшной полости

90. Если у ребенка с травмой живота диагностировано внутрибрюшное кровотечение, повреждение селезенки, наблюдается стабильная гемодинамика, то действия врача-детского хирурга включают

- А) наблюдение, консервативную терапию
- Б) проведение лапаротомии, ревизии брюшной полости
- В) проведение лапароскопии
- Г) проведение лапароцентеза

91. Показанием к операции по поводу пахово-мошоночной грыжи является

- А) возраст после 5 лет
- Б) диаметр выпячивания более 3 см
- В) установление диагноза
- Г) частое ущемление

92. Ущемление брыжейки внедренной одной части кишки в просвет другой части кишки называют

- А) перекрутом
- Б) заворотом
- В) странгуляцией
- Г) обтурацией

93. Оптимальный возраст для проведения оперативного вмешательства при паховой грыже составляет

- А) 3 года
- Б) 1 год
- В) 6 месяцев
- Г) 2 года

94. Для ликвидации «калового завала» при болезни Гиршпрунга используется _____ клизма

- А) сифонная
- Б) масляная
- В) гипертоническая
- Г) обычная очистительная

95. Дифференциальная диагностика пилоростеноза проводится с

- А) атрезией тощей кишки
- Б) атрезией пищевода
- В) пилороспазмом
- Г) родовой травмой органов брюшной полости

96. При перитоните ведущим симптомом является

- А) наличие болей в животе, сопровождающихся «светлыми» промежутками
- Б) наличие признаков кишечного кровотечения в виде обильного стула с кровью
- В) напряжение мышц передней брюшной стенки
- Г) неукротимая рвота с примесью желчи и прожилками крови

97. Пусковым механизмом возникновения инвагинации чаще всего является

- А) травма брюшной полости
- Б) нарушение пищевого режима ребенка
- В) перенесенная кишечная инфекция
- Г) подвижный образ жизни

98. При мелене у ребенка необходимо исключить

- А) кровоточащий дивертикул Меккеля
- Б) острую язву желудка
- В) трещину ануса
- Г) ректосигмоидит

99. Если на рентгенограмме наблюдается тотальное затемнение плевральной полости со смещением средостения в пораженную сторону, то вероятным диагнозом является

- А) плащевидный плеврит
- Б) абсцесс легкого
- В) ателектаз легкого
- Г) тотальная эмпиема плевры

100. Дивертикул Меккеля локализуется на

- А) восходящем отделе ободочной кишки
- Б) тощей кишке
- В) подвздошной кишке
- Г) слепой кишке